

POR ALERGIAS A LA PROTEÍNA DE LECHE DE VACA (APLV)

A completar por el/la pediatra

Nombre completo de el/la paciente:

Fecha de nacimiento:

Peso actual (kg):

Percentilo:

Información importante sobre la alergia a la proteína de leche de vaca

La APLV es una respuesta inadecuada del sistema inmune tras la ingestión, contacto o inhalación de alimentos que contienen proteína de leche de vaca (PLV) o sus derivados. El tratamiento involucra un equipo multidisciplinario (pediatra, gastroenterólogo infantil, alergista y nutricionista), que supervisará la evolución del niño, así como las dietas de la madre y el lactante.

Niños con lactancia materna exclusiva

En los casos de lactancia materna exclusiva, se recomienda eliminar cuidadosamente de la dieta materna todos los productos que contengan PLV durante un período de 2 a 4 semanas. Si los síntomas mejoran o desaparecen, se reintroducirá PLV en la dieta de la madre al finalizar las 4 semanas. Si los síntomas reaparecen, se confirmará el diagnóstico de APLV. Durante el tiempo que dure la lactancia, será necesario evitar la PLV en la dieta materna, y no se incluirá PLV en la alimentación complementaria del lactante hasta que cumpla 12 meses de edad.

Niños alimentados con fórmulas o alimentación mixta

En el caso de los niños alimentados con fórmula o con alimentación mixta, se deberá administrar una fórmula hidrolizada extensamente por un período de 2 a 4 semanas. Si los síntomas mejoran, se reintroducirá PLV al cabo de este período. Si los síntomas reaparecen, se confirmará el diagnóstico de APLV, y el lactante deberá continuar con la fórmula especial hasta los 12 meses. Si no hay recurrencia de síntomas, se descarta APLV y se podrá suspender la dieta de eliminación.

DIAGNÓSTICO

Factores genéticos	Historia familiar de atopía	Presencia de asma	Dermatitis atópica
Factores ambientales	Alimentación con fórmula	Nacimiento por cesárea	Uso de ATB

IgE mediada: Al contacto present (marcar con una X lo que corresponda).

Urticaria	Angioedema	Vómitos	Rinoconjuntivitis	Tos	Anafilaxia x IgE específica
-----------	------------	---------	-------------------	-----	-----------------------------

No IgE mediada: Presentación tardía de síntomas (marcar con una X lo que corresponda).

Diarrea con sangre y mocos	Cólicos, diarrea y vómitos	Eccema, dermatitis atópica	Edema y prurito en labios	Fallo de crecimiento	Rinoconjuntivitis	Urticaria	Shock anafiláctico
----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------	-----------	--------------------

POR ALERGIAS A LA PROTEÍNA DE LECHE DE VACA (APLV)

Este formulario debe estar acompañado de:

- Historia clínica detallada (examen físico, curva pondoestatural, valoración nutricional, historia dietaria).
- Prueba exclusión- provocación

Comentarios:

Firma y sello del profesional tratante: _____ Fecha: _____